

Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur - OVDAS



REGION	Los Lagos		
RAV No.	9	Fecha - Hora	28 de abril de 2015 16:00 HL
Periodo Evaluado:	27 abril (15:00 HL)	28 abril (15:00 HL)	
Volcán	Calbuco	GVP ID	358020
RAV anterior	ROJA	Alerta actual	ROJA

1. OBSERVACIONES

1.1 Vigilancia volcánica:

1.1.1 Actividad sísmica: Durante las últimas 24 horas se ha registrado un aumento transitorio de la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del volcán, con un registro de señal de tremor con frecuencias dominantes entre 0.7 - 1 Hz, y valores de Desplazamiento Reducido [DR, parámetro que indica el tamaño de la señal sísmica en el origen] menores a 21,6 cm², valores considerados moderados; de igual forma se registraron veintiseis (26) eventos tipo Largo Periodo, con magnitudes locales [ML, medida del tamaño de los sismos con base en las características de la amplitud de la onda sísmica] igual y menores a 2,4 y desplazamientos reducidos (DR) menores a 192,6 cm², valores considerados moderados. Además, el sismo de largo periodo de mayor energía se registró durante un episodio de incremento del tremor continuo entre las 02:35 HL (05:35 GMT) y 07:30 HL(10:30 GMT), también acompañado de actividad superficial explosiva débil a las 04:54 HL(07:54 GMT). En cuanto a la sismicidad de tipo VT [asociado con ruptura de roca] se registraron cincuenta y cuatro (54) sismos, siendo el de mayor energía un evento con magnitud local [ML] igual a 1,50 localizado 3,8 km al WNW del cráter a una profundidad de 8,4 km.

No. Eventos	ML Max VT / ML Max LP	TR DR máximo
54 VT 26 LP	1,5 / 2,0	21,6 cm ²

Observaciones: Aumento de la señal de tremor acompañada con breve actividad superficial explosiva de menor energía que los días recientes. Continúa dispersión de ceniza fina desde columna baja con dirección variable entre hoy y mañana.

1.1.2 Actividad superficial

Columna Altura (km)	Dirección principal	Pluma Distancia (km)	Fuente información
1,5	NE	25	Cámara IP, Imagen Satelital

Incandescencia	SÍ	Altura máxima (km)	100
----------------	----	--------------------	-----

Observaciones: La nubosidad presente en el sector ha permitido visualizar solo parcialmente la columna de gases e incandescencia durante la noche, a través de las cámaras IP.

Durante la tarde del día de ayer se registró una anomalía térmica en el cráter, reportada en el sitio MIROVA (<http://www.mirovaweb.it/>).

1.1.3 Otras Observaciones:

2. Peligro

El volcán Calbuco corresponde a unos de los volcanes de mayor riesgo específico del país. Su etapa evolutiva más reciente (últimos 14.500 años) se inicia con un evento de colapso volcánico, el cual generó un anfiteatro de 2 km de diámetro. Los eventos eruptivos posteriores han comprendido erupciones tanto efusivas como explosivas, estas últimas eventualmente plinianas y responsables de la generación del mayor depósito de flujo piroclástico del volcán, el cual alcanza inclusive la localidad de Puerto Montt, distante a más de 30 km. Durante la prehistoria reciente se generó un gran cráter hacia la cumbre del edificio moderno, de hasta 1.5 km de diámetro, con una escotadura más baja hacia el noreste. Desde el año 1893 se comenzó a construir una secuencia de domos dentro del anfiteatro de colapso eruptivo, la cual continuó su construcción durante las erupciones de los años 1911-12, 1917, 1921 y 1961. Las erupciones históricas han sido habitualmente acompañadas por numerosos flujos piroclásticos de bloques y ceniza, además de lahares calientes y fríos que han escurrido, preferentemente, hacia los ríos Tepú, Blanco Norte, Caliente - Hueñuhueñu, Este, Colorado y Blanco Sur. Las condiciones actuales sugieren que la generación de columnas eruptivas con alturas mayores a 15 km s.n.m continúan siendo eventos probables en el corto plazo, en cuyo caso cabe la posibilidad de colapsos parciales de éstas, produciendo flujos piroclásticos de moderado alcance en torno al volcán. Idéntica relevancia adquiere la posibilidad de lahares a través de los cursos fluviales principales, los que pueden alcanzar los lagos Llanquihue y/o Chapo. La ocurrencia de eventos explosivos considerables pueden generar dispersión y acumulación de importante cantidad de material piroclástico, concentrado preferentemente hacia los cuadrantes N, NE y E.

VER MAPA DE PELIGROS ANEXO

Exposición/Riesgo específico

La zona considerada como área de peligro en las condiciones actuales se circunscribe al sector interno que contiene a las áreas afectadas en la fase más intensa de la erupción. Los procesos esperados corresponden a la generación de piroclastos balísticos, flujos piroclásticos asociados a colapsos de columnas eruptivas y/o colapsos parciales de domos y su posterior transformación en lahares. Adicionalmente, lahares secundarios podrían afectar más allá de la zona proximal a lo largo de los cauces que drenan directamente del edificio volcánico o en otros sectores con acumulación significativa de material piroclástico.

3. Conclusión:




Durante la madrugada del día de hoy se registró un incremento del tremor continuo (señal asociada con movimiento de fluidos al interior del volcán) correlacionado temporalmente con actividad a nivel superficial, que generó incandescencia nocturna. Sin embargo, la señal sísmica retornó a niveles bajos en horas de la madrugada. Al momento de emisión de este reporte, la sismicidad presenta un nivel estable. El registro sísmico sigue dominado por señales tipo VT (asociadas con ruptura de material rocoso), y en menor porcentaje señales asociadas con movimiento de fluidos al interior del volcán (señales tipo LP y TR). Continúa también la emisión permanente de material particulado hacia superficie, pero con una columna débil, poco densa y de menor altura (< 1,5 km). Aunque el proceso ha perdido potencia, aún se mantiene la probabilidad de que el sistema volcánico evolucione hacia condiciones que favorezcan una reactivación de la actividad eruptiva, aunque probablemente de menor envergadura en comparación con la fase explosiva inicial, y por lo tanto se sugiere mantener la restricción de acceso a la zona próxima al volcán de acuerdo al criterio definido. Por otra parte, el material piroclástico inestable acumulado en la parte superior del volcán y en sus laderas, así como en sectores aledaños, podría ser removilizado por lluvia dando origen a lahares secundarios a lo largo de los ríos que drenan del volcán y las cuencas vecinas. Los 'lahares secundarios' son aluviones volcánicos causados por la removilización parcial de material piroclástico depositado durante o de manera posterior a una erupción, normalmente causados por precipitaciones intensas. De esta forma, se sugiere prestar especial atención a la ocurrencia de estos fenómenos debido al pronóstico de lluvias durante los próximos días, particularmente en los cauces que descienden del volcán, en una franja de 200 m de ancho a cada costado de ellos, y en otros sectores donde hay acumulación importante de material piroclástico.

Reporta	OVDAS-RNVV	Recepción:
---------	------------	------------

Sernageomin - Red Nacional de Vigilancia Volcánica

Mapa de Peligros Volcánicos


Volcán Calbuco, 28 - 29 de abril de 2015



Leyenda



Población



Caminos



Límite de restricción



Dispersión de ceniza



Evidencia de afectación



Zona de peligro volcánico